

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	057	CODE	002001001057
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Pembrolizumab+EC【APR併用】		
申請年月日	令和 4 年	10月17日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
エピルビシン	DIV	90 mg/m <sup>2</sup>
エンドキサン	DIV	600 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: ( 1 投 2 休 ) or (投与間隔 21 日)《 4 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																																
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/インラインフィルター使用	IV		●																					(●)										
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)										
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)										
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路:【アプレピタント服用】	30分 DIV		●																					(●)										
5	エピルビシン ( )mg +生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分以内 DIV		●																					(●)										
6	エンドキサン ( )mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	60分 DIV		●																					(●)										
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)										
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																					(●)										
9	手技: 経路:																																		
10	手技: 経路:																																		