

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	061	CODE	002001001061
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Pembrolizumab+PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年	10月17日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
パクリタキセル	DIV	90 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日) 《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	Total時間入力																											
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用/プライミング用	IV																												
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV																												
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV																												
4	グラニセトロンバッグ 50mL +ファモチジン 20mg +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用/インラインフィルター使用	30分 DIV																												
5	パクリタキセル ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用30分後より	60分 DIV																												
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV																												
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV																												
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	061	CODE	002001001061
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	Pembrolizumab+PTX weekly		
申請年月日	令和 4 年 10月17日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
パクリタキセル	DIV	90 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

		投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 84 日)《 》クール																																			
		Total時間入力	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
投与順	Rp	投与時間	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84						
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用/プライミング用	IV									●																										
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV									●																										
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV									●																										
4	グラニセトロンバッグ 50mL +ファモチジン 20mg +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用/インラインフィルター使用	30分 DIV		●							●								●																		
5	パクリタキセル ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用30分後より	60分 DIV		●							●								●																		
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●							●								●																		
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●								●																		
8	手技: 経路:																																				
9	手技: 経路:																																				
10	手技: 経路:																																				